

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

# OMIX L.P. 0,4 mg,

## microgranules à libération prolongée en gélule

Chlorhydrate de tamsulosine

**Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.**

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

### Que contient cette notice ?

1. QU'EST-CE QUE OMIX L.P. 0,4 mg, microgranules à libération prolongée en gélule ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE OMIX L.P. 0,4 mg, microgranules à libération prolongée en gélule ?
3. COMMENT PRENDRE OMIX L.P. 0,4 mg, microgranules à libération prolongée en gélule ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER OMIX L.P. 0,4 mg, microgranules à libération prolongée en gélule ?
6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS.

### 1. QU'EST-CE QUE OMIX L.P. 0,4 mg, microgranules à libération prolongée en gélule ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : ALPHA-BLOQUANTS / MÉDICAMENTS UTILISÉS DANS L'HYPERTROPHIE BÉNIGNE DE LA PROSTATE - code ATC : G04CA02.

OMIX L.P. contient de la tamsulosine, une substance qui appartient à une famille de médicaments appelée alpha-bloquants.

OMIX L.P. est utilisé dans le traitement de certains troubles qui peuvent vous empêcher d'uriner normalement suite à une augmentation de volume (hypertrophie) bénigne de votre prostate.

Ce médicament est utilisé uniquement chez l'homme, dans le traitement des douleurs du bas appareil urinaire associé à un élargissement de la glande prostatique (hyperplasie bénigne de la prostate). Ces douleurs peuvent être des difficultés à uriner (débit urinaire faible), miction goutte à goutte, besoin urgent d'uriner et envie d'uriner fréquemment aussi bien la nuit que le jour.

### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE OMIX L.P. 0,4 mg, microgranules à libération prolongée en gélule ?

**Ne prenez jamais OMIX L.P. 0,4 mg, microgranules à libération prolongée en gélule :**

- Si vous êtes allergique (hypersensible) à la substance active (la tamsulosine) ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.
- Si vous êtes allergique (hypersensible) à un médicament de la même famille (les alphabloquants).
- Si vous avez déjà eu des gonflements (oedèmes) du visage, des lèvres et de certaines parties de votre corps (les muqueuses) après avoir pris ce médicament.
- Si vous avez déjà eu auparavant une baisse de votre tension artérielle lors d'un passage de la position couchée à la position debout pouvant s'accompagner de vertiges et de malaises (hypotension orthostatique).
- Si vous avez une maladie sévère du foie (insuffisance hépatique sévère).

#### Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre OMIX L.P. 0,4 mg, microgranules à libération prolongée en gélule.

#### Faites attention avec OMIX L.P. :

- Vous devez prévenir votre médecin si :
    - Vous prenez des médicaments pour traiter une tension artérielle élevée (antihypertenseurs).
    - Vous avez déjà eu des malaises alors que vous urinez ou après avoir uriné (syncope mictionnelle).
    - Vous avez une maladie des reins (insuffisance rénale chronique).
    - Vous avez plus de 65 ans.
    - Vous avez des maladies du cœur (patient coronarien).
- En cas d'aggravation d'un angor, le traitement par ce médicament devra être interrompu.

Pendant le traitement, si vous avez des gonflements (oedèmes) du visage, des lèvres et de certaines parties de votre corps (les muqueuses), cela peut être le signe d'une réaction allergique au médicament.

Dans ce cas, vous devez arrêter le traitement et consulter immédiatement votre médecin.

**Des malaises peuvent survenir rarement avec OMIX L.P. et des médicaments apparentés. Aux premiers signes de vertiges ou de faiblesse, vous devez vous asseoir ou vous allonger jusqu'à que les sensations de malaise disparaissent.**

- **Vous devez vous faire opérer de la cataracte ou du glaucome**

Si vous devez vous faire opérer prochainement de la cataracte (opacité du cristallin) ou du glaucome, et si vous avez été ou êtes actuellement ou prévoyez d'être traité par OMIX L.P., informez-en votre ophtalmologiste avant l'opération.

Le chirurgien pourra prendre des précautions appropriées en fonction de votre traitement au moment de l'intervention chirurgicale.

#### Recommandations concernant votre hygiène de vie

Durant le traitement vous devez respecter certaines mesures d'hygiène de vie et notamment :

- conservez une activité physique (marcher, courir ou faire du sport...),
- faites attention à votre alimentation tels que ne pas faire de repas trop riches, trop épicés et/ou trop alcoolisés,
- ne buvez pas trop le soir,
- maintenez un transit intestinal régulier.

#### Enfants et adolescents

Ne donnez pas ce médicament à des enfants ou des adolescents de moins de 18 ans, car il n'a pas d'effet thérapeutique dans cette population

#### Autres médicaments et OMIX L.P. 0,4 mg, microgranules à libération prolongée en gélules

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament, même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance.

**Ce médicament DOIT ÊTRE EVITÉ en association avec des médicaments de la même classe thérapeutique (alpha1-bloquants).** Cette association peut entraîner une diminution de la tension artérielle.

Il est important d'informer votre médecin si vous êtes traités en même temps avec des médicaments qui peuvent diminuer l'élimination de l'Omix (par exemple kétoconazole, érythromycine).

#### Grossesse, allaitement et fertilité

OMIX L.P. n'est pas indiqué chez la femme.

La tolérance de ce médicament au cours de la grossesse et son passage dans le lait maternel ne sont pas connus.

Chez l'homme, une éjaculation anormale a été rapportée (troubles de l'éjaculation).

Cela signifie que le sperme ne sort pas par l'urètre mais se dirige vers la vessie (éjaculation rétrograde) ou bien le volume d'éjaculation est diminué ou absent (échec de l'éjaculation). Ce phénomène est sans gravité.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

#### Conduite de véhicules et utilisation de machines

Ce médicament peut provoquer une baisse de la tension lors du passage à la position debout, des vertiges ou des malaises, notamment en début de traitement. Soyez prudent. Il est déconseillé de conduire un véhicule ou d'utiliser une machine si vous ressentez l'un de ces effets.

### 3. COMMENT PRENDRE OMIX L.P. 0,4 mg, microgranules à libération prolongée en gélule ?

#### Posologie

Respectez toujours la posologie indiquée par votre médecin. En cas de doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

La dose recommandée est de 1 gélule par jour.

152093

Omix

Cap

France

LFT 160 x 298 mm

LFT\_159

Project 40356

Eq. to: N/A

18.04.2017

STUDIOKEIJZER ms


 Black

#### Mode et voie d'administration

Le médicament est à utiliser par voie orale. La gélule doit être avalée avec un verre d'eau sans être croquée ni mâchée.

#### Fréquence d'administration

- Vous devez prendre votre dose quotidienne en une seule prise, de préférence à la fin du petit déjeuner. Si le matin, vous ne prenez pas de petit déjeuner consistant, prenez votre gélule à la fin d'un autre repas.
- Vous devez prendre votre gélule chaque jour au même moment de la journée.
- Au cas où vous auriez oublié de prendre la gélule au petit déjeuner, prenez-la au cours d'un repas de la journée.

#### Durée du traitement

Ce traitement nécessite une surveillance médicale régulière et il pourra être nécessaire de le poursuivre plusieurs mois.

Habituellement, OMIX L.P. est prescrit pendant une longue durée. Les effets sur la vessie et sur les mictions sont maintenus pendant toute la durée du traitement.

#### Si vous avez pris plus de OMIX L.P. 0,4 mg, microgranules à libération prolongée que vous n'auriez dû :

Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien et allongez-vous.

#### Si vous oubliez de prendre OMIX L.P. 0,4 mg, microgranules à libération prolongée :

Si vous avez oublié 1 jour de traitement, ne prenez pas 2 gélules le jour suivant mais poursuivez le traitement, le lendemain, au rythme d'une gélule par jour.

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

#### Si vous arrêtez de prendre OMIX L.P. 0,4 mg, microgranules à libération prolongée :

Si vous arrêtez de prendre votre traitement de façon prématurée, les symptômes fonctionnels de l'hypertrophie bénigne de la prostate peuvent réapparaître.

C'est pourquoi il est impératif de poursuivre votre traitement aussi longtemps que votre médecin vous l'a prescrit, même si les troubles dont vous souffrez ont déjà disparu.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

#### 4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

#### Les effets suivants surviennent fréquemment (de 1 à 10 personnes sur 100) :

- Des étourdissements, surtout lors du passage de la position couchée à la position debout.
- Ejaculation anormale (troubles de l'éjaculation). Cela signifie que le sperme ne sort pas par l'urètre mais se dirige vers la vessie (éjaculation rétrograde) ou bien le volume d'éjaculation est diminué ou absent (échec de l'éjaculation). Ce phénomène est sans gravité.

#### Les effets suivants surviennent peu fréquemment (de 1 à 10 personnes sur 1 000) :

- des maux de tête,
- des palpitations (le cœur bat plus rapidement que la normale et vous pouvez vous en rendre compte par vous-même),
- une baisse de la tension artérielle au moment du passage d'une position assise ou allongée à une position debout (hypotension orthostatique),
- un nez bouché et un nez qui coule (rhinite),
- des diarrhées, des nausées et des vomissements, une constipation,
- une fatigue (asthénie),
- des éruptions et des démangeaisons sur la peau (urticaire).

#### Les effets suivants surviennent rarement (de 1 à 10 personnes sur 10 000) :

- un malaise (syncope),
- une allergie que vous reconnaîtrez par des gonflements du visage des lèvres ou des autres parties du corps, **des difficultés à respirer ou des démangeaisons, éruption cutanée comme une réaction allergique (angioedème).**

#### Les effets suivants surviennent très rarement (moins de 1 personne sur 10 000) :

- Une érection prolongée et douloureuse (priapisme). Celle-ci doit immédiatement donner lieu à une prise en charge médicale,
- Eruption cutanée,
- Inflammation et formation de vésicules sur la peau et/ou les muqueuses des lèvres, des yeux, de la bouche, des voies nasales ou génitales (syndrome de Stevens-Johnson),

#### Les effets suivants surviennent à une fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base des données disponibles) :

- Vision trouble,
- Troubles de la vision,
- Saignements de nez (Epistaxis),
- Eruptions cutanées sévères (Erythème polymorphe, dermatite exfoliative),
- Rythme cardiaque irrégulier (fibrillation auriculaire, arythmie, tachycardie),
- Difficultés à respirer (dyspnée),
- Bouche sèche.

#### Si vous devez vous faire opérer de la cataracte ou du glaucome

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou, votre pharmacien ou à votre infirmier/ère. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance – Site internet : [www.ansm.sante.fr](http://www.ansm.sante.fr) En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

#### Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou, votre pharmacien ou à votre infirmier/ère. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance – Site internet : [www.ansm.sante.fr](http://www.ansm.sante.fr) En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

#### 5. COMMENT CONSERVER OMIX L.P. 0,4 mg, microgranules à libération prolongée en gélule ?

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur la boîte après {EXP}. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Pas de précautions particulières de conservation.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

#### 6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS

#### Ce que contient OMIX L.P. 0,4 mg, microgranules à libération prolongée en gélules

La substance active est :  
Chlorhydrate de tamsulosine ..... 0,400 mg  
Quantité correspondant à tamsulosine ..... 0,367 mg  
Pour une gélule.

Les autres composants sont :

Composition des microgranules à l'intérieur de la gélule :  
Cellulose microcristalline, copolymère d'acide méthacrylique (Type C Eudragit L30D-55), polysorbate 80, laurylsulfate de sodium, triacétine, stéarate de calcium, talc.

Composition de l'enveloppe de la gélule : Gélatine, indigotine (E132), dioxyde de titane (E171), oxyde de fer jaune (E172), oxyde de fer rouge (E172), encre noire d'impression.

**Qu'est-ce que OMIX L.P. 0,4 mg, microgranules à libération prolongée en gélule et contenu de l'emballage extérieur ?**  
Microgranules à libération prolongée en gélule (orange et vert olive). Boîte de 30.

#### Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché

**ASTELLAS PHARMA**  
26 QUAI CHARLES PASQUA  
92300 LEVALLOIS PERRET

#### Exploitant de l'autorisation de mise sur le marché

**ASTELLAS PHARMA**  
26 QUAI CHARLES PASQUA  
92300 LEVALLOIS PERRET

#### Fabricant

**ASTELLAS PHARMA EUROPE B.V.**  
SYLVIVUSWEG 62  
2333 BE LEIDEN  
PAYS BAS

**La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est : avril 2017.**

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'Ansm (France).



152093